

PROSPECTO

plaskine[®] neomicina

POMADA – VIA TOPICA

COMPOSICION

Por gramo:

Plaskine[®] (acexamato de lisina).....105 mg

Undecilenato de neomicina..... 15 mg

(equivalentes a 5 mg de neomicina base)

Excipientes:

Estearato de glicol y polioxietilenglicoles. Glicéridos polioxietilénicos de los ácidos lauro y palmito esteárico. Lanolina. Cera lanette. Palmitato de cetilo. Isoestearato de isoestearilo. p-Hidroxibenzoatos de metilo y propilo. Vaselina. Dibutilhidroxitolueno. Edetato disódico. Esencia. Agua desionizada.

PROPIEDADES

La terapéutica de las heridas no debe sólo intentar una cicatrización rápida sino también estética. Los retardos de cicatrización así como la formación de cicatrices viciosas son dos fenómenos que acostumbran a responder a la misma causa: el exceso de proliferación fibrosa del tejido conjuntivo. El acexamato de lisina de PLASKINE[®] NEOMICINA regula la formación fibrosa conjuntiva y facilita la epidermización, ofreciendo a ésta un subsuelo conjuntivo normal, garantía indispensable para una cicatrización rápida, estética y de buena calidad, al tiempo que el undecilenato de neomicina, por su poder antibiótico, contribuye a la asepsia local.

INDICACIONES

Tratamiento de las cicatrizaciones cutáneas difíciles y prevención de las cicatrices viciosas (retráctiles, queiloideas, hipertróficas, adherentes a planos profundos, etc.). Heridas traumáticas y quirúrgicas. Quemaduras. Ulceras varicosas y tróficas. Escaras por decúbito o por compresiones diversas.

POSOLOGIA (Salvo prescripción médica)

PLASKINE[®] NEOMICINA se aplicará cada doce - veinticuatro horas.

NORMAS PARA LA CORRECTA APLICACION

Límpiese cuidadosamente la parte afectada con agua hervida tibia, séquese y extiéndase sobre ella una ligera capa de pomada friccionando suavemente. Cúbrase si es necesario con una gasa estéril.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

PRECAUCIONES

Ninguna en especial.

EMBARAZO Y LACTANCIA

El preparado puede utilizarse durante el embarazo y la lactación.

INTERACCIONES

No se han descrito.

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Excepcionalmente pueden aparecer manifestaciones alérgicas por la aplicación tópica de la neomicina, que desaparecerán al suspender la medicación. En caso de aparición de alguna reacción adversa que no estuviese descrita en este prospecto, el paciente deberá comunicarlo de inmediato a su médico o farmacéutico.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

La carencia de toxicidad del acexamato de lisina y la ausencia de absorción del undecilenato de neomicina hacen que sea prácticamente imposible la presentación de un cuadro tóxico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91-562 04 20.

CONDICIONES DE CONSERVACION

El preparado no precisa ninguna condición especial de conservación.

PRESENTACION

plaskine® neomicina pomada: Tubo con 35 g.

CON RECETA MEDICA

| |
|--|
| LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS |
|--|

IPSEN PHARMA, S.A.

Ctra. Laureà Miró, 395

08980 Sant Feliu de Llobregat - Barcelona, España

TEXTO REVISADO: Noviembre 2001