

PROSPECTO

MERBROMINA EDIGEN

USO TÓPICO

15 ml

FÓRMULA POR 100 ml:

Merbromina (D.C.I.) 2 g

Agua destilada

INDICACIONES:

Desinfección de pequeñas heridas (cortes, desgarros, pinchazos). Forúnculos, uñeros, grietas. Pequeñas quemaduras. Rozaduras. Escoceduras.

DOSIFICACIÓN:

Aplicar 2 ó 3 veces al día.

NORMAS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL PREPARADO:

Aplicación tópica. Lavar la herida cuidadosamente, secar y aplicar sobre la superficie unas gotas de Merbromina Edigen extendiéndolas cuidadosamente.

Puede repetirse la aplicación 2 ó 3 veces al día.

CONTRAINDICACIONES:

No emplear en los ojos ni fosas nasales.

PRECAUCIONES:

Se inactiva por la presencia de proteínas orgánicas (sangre, suero).

No aplicar sobre grandes superficies corporales, ni con vendajes no transpirables.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

En personas hipersensibles puede producir sensibilización de la piel (eczema de contacto).

INCOMPATIBILIDADES:

Con ácidos, sales alcaloídicas y con la mayoría de los anestésicos locales.

INTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO:

En caso de ingestión accidental o sobredosis, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Telf.: (91) 562 04 20, para realizar un lavado gástrico y si fuera necesario la administración de Dimercaprol en dosis de 4 mg/kg de peso.

CONSERVACIÓN:

No se deben tomar medidas especiales debido a la buena estabilidad del preparado.

PRESENTACIÓN:

Envases de 15 ml

VENTA SIN RECETA MÉDICA

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS.**

Lab. EDIGEN S.A.
Ctra. M-300 Km. 29,920
28802 Alcalá de Henares (Madrid)